

**Показники роботи
КП «ДОПЦ зі стаціонаром» ДОР» III рівня
за 12м-ці 2020 рік**

Показники	Абсолютні дані	Відносні показники
Кількість пологів	3319	
Кількість живонароджених	3369+2 інш. лпз	
Кількість новонароджених з масою тіла <2500 г	336	10%
Кількість новонароджених з масою тіла <1500 г	99	2.9%
Кількість новонароджених з масою тіла <1000 г	53	1,5%
Кількість пологів з терміном менше 37 повних тижнів вагітності	174	62%
Кількість пологів з терміном менше 32 повних тижнів вагітності	58	20.6%
Кількість пологів з терміном менше 28 повних тижнів вагітності	49	17.4%
Кількість асфіксії новонароджених на першій хвилині (< 7 балів)	340	10,0%
Кількість новонароджених з оцінкою за шкалою Апгар менше 3 балів на п'ятій хвилині	63	1,8 %
Неонатальна смертність (до 28 днів життя)	7	2,1‰
Рання неонатальна смертність (0-7 днів життя)	11	3,3‰
Мертвонароджуваність	43	12.6‰
Аntenатальна смертність	33	10‰
Інтранатальна смертність	10	2.6‰
Перинатальна смертність	54	15.8‰
Кількість випадків материнської смертності	-	
З прямих причин (ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду)	-	
З непрямих причин (за рахунок існуючого захворювання або захворювання під час вагітності, пологів та післяпологового періоду)	-	
Кількість акушерських кровотеч	56/49м	1,7%/1,5%
Кількість жінок з токсикозом (у тому числі прееклампсією)	226/33сер 34т	6,7%
Екстрагенітальна патологія	2265	68,2%
Розродження шляхом кесаревого розтину (КР)	976	29,4%
Кількість епізіотомій	66	1.9%
Кількість жінок, що мали травми пологових шляхів, що потребували ушивання	475	28.6%
Інструментальні пологи: вакуум-екстракція; акушерські щипці	15 -	0,4 -
Кількість родостимуляцій	312	10,2%
Кількість родозбуджень	141	4,6%
Кількість жінок, яким було надано анестезіологічну допомогу під час / після пологів	1819	54,8%
Кількість післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 110 г/л (11 г%))	878	26,4 %
Кількість важких післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 70 г/л)	52	1,6%
Кількість жінок з позитивним тестом на сифіліс серед породіль	-	-
Кількість ВІЛ-інфікованих жінок серед породіль	27	0,8%
Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі нормальних пологів (днів)	3,4	
Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі інструментальних пологів (вакуум, щипці) (днів)	4,5	
Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі кесаревого розтину (днів)	4,9	
Кількість жінок (вагітних, роділь, породіль), що були переведені в інші стаціонари	3	0,1%
Кількість новонароджених, що були переведені в інші стаціонари	79	2,3%